

# ФУЦИТАЛМИК, капли (FUCITHALMIC) — инструкция по применению

## Клинико-фармакологическая группа

Антибиотик для местного применения в офтальмологии.

## Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные в виде вязкой суспензии белого или почти белого цвета.

	1 г
фузидовая кислота микронизированная (в пересчете на фузидовую кислоту безводную)	10 мг,
эквивалентно фузидовой кислоты гемигидрату	10.17 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 100 мкг, динатрия эдетат - 500 мкг, маннитол - 50 мг, карбомер - 5 мг, натрия гидроксид - q.s., вода очищенная - до 1 г.

5 г - тубы алюминиевые с наконечником полиэтиленовым - пачки картонные.

## Показания

Лечение бактериальных инфекций глаз, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами:

- конъюнктивит;
- блефарит;
- кератит;
- дакриоцистит.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Дозировка

Взрослым и детям с 0 лет закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок пораженного глаза 2 раза/сут в течение 7 дней.

## Побочные действия

Определение частоты побочных реакций: очень часто ( $> 1/10$ ), часто ( $> 1/100, < 1/10$ ), нечасто ( $> 1/1000, < 1/100$ ), редко ( $> 1/10\ 000, < 1/1000$ ), очень редко ( $1/10\ 000$ , включая отдельные сообщения).

Со стороны органа зрения: часто - жжение и зуд в глазу, ощущение сухости и болезненности в глазу, кратковременное затуманивание зрения, конъюнктивальная гиперемия, отек век; нечасто - слезотечение; редко - обострение конъюнктивита, отек переходной складки конъюнктивы; частота неизвестна - периорбитальный отек

Аллергические реакции: частота неизвестна - зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

## Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.