

# ГИДРОКОРТИЗОН, мазь (HYDROCORTISONE)

## инструкция по применению

### Клинико-фармакологическая группа

ГКС для местного применения в офтальмологии.

### Форма выпуска, состав и упаковка

Мазь глазная 0.5% белого, белого с желтоватым оттенком или желтого цвета.

	1 г
гидрокортизона ацетат	5 мг

Вспомогательные вещества: нипагин (метилпарагидроксибензоат или метилпарабен), вазелин.

3 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Показания

- воспаление переднего отдела глаза при ненарушенном эпителии роговицы (травмы и хирургические вмешательства на глазном яблоке);
- симпатическая офтальмия;
- конъюнктивит;
- блефарит;
- ирит;
- иридоциклит;
- кератит;
- увеит;
- воспаление на фоне химических и физических воздействий.

### Противопоказания

- период вакцинации;
- вирусные, грибковые и инфекционные поражения глаз;
- нарушение целостности глазного эпителия;
- трахома;
- туберкулез глаз;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при артериальной гипертензии, сахарном диабете, беременности, в период лактации.

## Дозировка

В конъюнктивальный мешок вводят по 1-2 см глазной мази 2-3 раза/сут.

## Побочные действия

Со стороны органа зрения: жжение, инъектированность склер; при длительном применении - задняя субкапсулярная катаракта, повышение внутриглазного давления, экзофтальм, склонность к развитию вторичной грибковой, бактериальной или вирусной инфекции глаз, трофические изменения роговицы.

## Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

## Лекарственное взаимодействие

Повышается риск развития катаракты при применении на фоне ГКС антипсихотических средств (нейролептиков), карбутамида и азатиоприна.

Одновременное применение ГКС с холиноблокаторами (в т.ч. антигистаминными препаратами, трициклическими антидепрессантами) и нитратами способствует повышению внутриглазного давления.

## Особые указания

Во время лечения препаратом не следует пользоваться контактными линзами.

При применении глазных капель интервал времени между их аппликацией и нанесением мази - не менее 15 мин.

При применении мази более 2 недель и наличии в анамнезе глаукомы следует контролировать внутриглазное давление.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В течение 30 мин после применения мази необходимо воздерживаться от занятий, требующих повышенного внимания.

## Беременность и лактация

Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. Принимать препарат при беременности рекомендуется не более 7-10 дней.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Условия отпуска из аптек**

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## **Условия и сроки хранения**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 5° до 15°С. Срок годности - 2 года.