

ПОЛУДАН, капли (POLUDAN) — инструкция по применению

Регистрационный номер: ЛП 000155-061114

Торговое название: Полудан®

Лекарственная форма: капли назальные

Состав

активное вещество:

полирибоадениловой кислоты калиевая соль (калия полирибоаденилат) - 0,05 мг;

полирибоуридиловой кислоты калиевая соль (калия полирибоуридилат) - 0,0535 мг

вспомогательные вещества: натрия гидрофосфат (натрий фосфорнокислый 2-

замещенный) - 2,0 мг; калия дигидрофосфат (калий фосфорнокислый 1-замещенный

безводный) - 0,408 мг; динатрия эдетат (трилон Б) - 0,336 мг; натрия хлорид - 8,5 мг; вода для инъекций - до 1 мл.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость

Фармакотерапевтическая группа: иммуностимулирующее средство

Код АТХ: S01AD

Фармакологические свойства

Полудан® - биосинтетический полирибонуклеотидный комплекс полирибоадениловой и полирибоуридиловой кислот. Индуктор синтеза эндогенного интерферона. Стимулирует образование в основном альфа-интерферона, в меньшей степени бета- и гамма-интерферона. Индуцирует синтез интерферона в лейкоцитах периферической крови, а также в тканях и органах, содержащих лимфоидные элементы. Высокий уровень интерферона поддерживается ежедневными введениями на протяжении всего курса. Обладает прямым противовирусным действием в отношении вирусов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Модулирует цитокиновый ответ при инфицировании клеток вирусом.

Показания к применению

Лечение гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Местно.

Для лечения гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций у взрослых по 2 капли в каждую ноздрю 5 раз в день в течение 5 дней в острый период заболевания — не позднее 24-48 часов с момента появления первых симптомов.

Побочное действие

Редко возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении препарата Полудан® с ферментными препаратами в связи с разрушающим действием ферментов на эндогенный интерферон, клиническая эффективность препарата Полудан® уменьшается.

Совместим с антибиотиками и лекарственными средствами для лечения вирусных инфекций.

Особые указания

Побочные явления носят транзиторный характер и исчезают после отмены препарата через 1-3 суток.

Форма выпуска

Капли назальные 50 ЕД/мл. По 5 мл во флаконах стеклянных. По 1 флакону в комплекте с 1 крышкой-капельницей вместе с инструкцией по применению в пачке из картона. По 3 флакона в комплекте с 3 крышками-капельницами вместе с инструкцией по применению в пачке с перегородками или специальными гнездами из картона. По 100 флаконов в комплекте с 100 крышками-капельницами с равным количеством инструкций по применению в коробке из картона (для стационаров).

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «ЛЭНС-Фарм», дочерняя компания ОАО «ВЕРОФАРМ».

Юридический адрес Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус 67.

Адрес производства и принятия претензий

Россия, 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус 67, корпус 95.

Тел./факс (49243) 7-17-53

или Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14

Тел.: (4722) 21-32-26; факс: (4722) 21-34-71