

СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ, капли (SULFACYL SODIUM) — инструкция по применению

Состав

Капли глазные	1 мл
активное вещество:	
сульфацетамида натрия моногидрат (сульфацил натрия), в пересчете на 100% вещество	200 мг
вспомогательные вещества: натрия тиосульфат — 1 мг; хлористоводородная кислота раствор 1 М — до pH 8; вода для инъекций — до 1 мл	

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — противомикробное.

Способ применения и дозы

В конъюнктивальный мешок.

Взрослым и детям закапывают по 1–2 капли препарата в каждый конъюнктивальный мешок 4–6 раз в сутки.

Для профилактики бленнореи у новорожденных закапывают по 2 капли препарата в каждый конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и по 2 капли через 2 ч.

Форма выпуска

Капли глазные 20%. По 5 или 10 мл во флаконах ПЭ, укупоренных колпачками. Каждый флакон вкладывают в пачку из картона.

Производитель

Публичное акционерное общество (ПАО) «Фармак». 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.

Тел./факс: (8-10-38-044) 417-10-55, 417-60-49.

Организация, принимающая претензии от потребителей: представительство ПАО «Фармак».
121357, Россия, Москва, Кутузовский пр-т, 65.

Тел.: +7 (495) 440-07-85, +7 (495) 440-34-45.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 8–15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона — 28 сут.