

# ВИДИСИК, гель (VIDISIC) инструкция по применению

## Клинико-фармакологическая группа

Препарат для увлажнения и защиты роговицы.

## Форма выпуска, состав и упаковка

Гель глазной 0.2% прозрачный, бесцветный, вязкий.

	1 г
карбомер	2 мг

Вспомогательные вещества: цетримид, сорбитол, натрия гидроксид, вода д/и.

10 г - тубы - пачки картонные.

## Показания

- недостаточная продукция слезной жидкости;
- синдром сухого глаза.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Дозировка

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 раз/сут в зависимости от тяжести и выраженности жалоб.

## Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, преходящее затуманивание зрения, чувство жжения, раздражение глаз.

## Передозировка

Данные о передозировке препарата Видисик отсутствуют.

## Лекарственное взаимодействие

В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением Видисика и других препаратов должен составлять не менее 5 мин. Видисик следует применять последним.

## Особые указания

В период применения препарата не рекомендуют ношение мягких контактных линз.

При ношении контактных линз их следует снять перед использованием геля и не устанавливать раньше чем через 15 мин после инстилляции препарата.

Тубу следует закрывать после каждого использования. Не следует прикасаться кончиком тубы к глазу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## Беременность и лактация

С осторожностью следует применять Видисик при беременности и в период лактации.

## Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## Условия и сроки хранения

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 2° до 30°С. Срок годности - 3 года.

После вскрытия тубика препарат следует использовать в течение 6 недель.