

Каталин, таблетки в комплекте с растворителем для приготовления раствора (глазные капли) (CATALIN) — инструкция по применению

Фармакологическая группа

Средство лечения катаракты.

Состав

| | |
|---|--------------------|
| Таблетки в комплекте с растворителем для приготовления раствора (глазные капли) | 1 табл. (75 мг) |
| пиреноксин | 0,75 мг |
| аминоэтилсульфоновая кислота | 62 мг |
| борная кислота | 12,15 мг |
| растворитель: изотонический буферный раствор, содержащий 0,02% метилпарагидроксибензоата и 0,01% пропилпарагидроксибензоата; борная кислота — 1,2%, натрия борат — 0,008% в качестве консервантов | |

Описание лекарственной формы

Таблетки от оранжево-красного до желтого цвета в комплекте с прозрачным бесцветным растворителем. После растворения — прозрачный раствор от оранжево-красного до желтого цвета.

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — антикатарактное.

Фармакодинамика

Пиреноксин конкурентно ингибирует действие хиноновых веществ, продуцируемых в результате аномального метаболизма ароматических аминокислот и стимулирующих превращение водорастворимого белка в хрусталике в нерастворимый, в результате чего вещество хрусталика мутнеет. Ингибируя действие хиноновых веществ, пиреноксин предотвращает развитие катаракты.

Показания

Начальные этапы старческой катаракты.

Побочные действия

Возможно развитие поверхностного кератита, блефарита, покраснение конъюнктивы, ощущение жжения или зуда после закапывания препарата.

Взаимодействие

Не рекомендуется применять одновременно с глазными каплями, содержащими ионы металлов (растворы серебра, колларгол, сульфат цинка), т.к. Каталин изменяет цвет в их присутствии.

Способ применения и дозы

Конъюнктивально. Непосредственно перед использованием растворить 1 табл. в 15 мл растворителя и закапывать в конъюнктивальный мешок по 1–2 капли раствора 3–5 раз в день.

Особые указания

При закапывании не касаться кончиком пипетки глаза.

Форма выпуска

Таблетки в комплекте с растворителем для приготовления раствора (глазные капли). 1 табл. 0,75 мг и 15 мл прозрачного растворителя.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Условия хранения

В прохладном, защищенном от света месте, при комнатной температуре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. После растворения препарат использовать в течение 20 дней.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.