

КВИНАКС, капли (QUINAX) — инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Препарат, применяемый при катаракте.

Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные в виде пурпурно-красного прозрачного раствора.

	1 мл
натрия азапентацена полисульфонат	150 мкг

Вспомогательные вещества: борная кислота, тиомерсал, метилпарабен, пропилпарабен, вода очищенная.

15 мл - флакон-капельницы пластиковые "Drop Tainer" - пачки картонные.

Показания

Катаракта:

- старческая;
- травматическая;
- врожденная;
- вторичная.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка

Препарат закапывают по 1-2 капли в конъюнктивный мешок пораженного глаза (или глаз) 3-5 раз/сут.

Побочные действия

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка

При случайном приеме внутрь не установлено симптомов передозировки.

Лекарственное взаимодействие

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время не установлено.

Особые указания

Квинакс предназначен для длительной терапии. Не рекомендуется прерывать лечение даже в случае быстрого улучшения.

Пациенты, использующие контактные линзы, должны применять Квинакс только при снятых линзах и могут устанавливать их обратно через 15 мин после закапывания препарата.

После каждого использования препарата необходимо закрывать флакон. Не следует прикасаться кончиком капельницы к глазу.

Использование в педиатрии

Достаточного опыта по применению Квинакса у детей нет. Возможно применение Квинакса у детей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития возможных побочных эффектов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после инстилляций временно нарушается четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости зрения, сразу после закапывания препарата.

Беременность и лактация

Достаточного опыта по применению Квинакса при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) нет. Возможно применение Квинакса у беременных женщин и кормящих матерей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или грудного ребенка.

Применение в детском возрасте

Достаточного опыта по применению Квинакса у детей нет. Возможно применение Квинакса у детей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития возможных побочных эффектов.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 24°С. Срок годности – 3 года.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.