

БАЛАРПАН, капли (BALARPAN) инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Препарат, стимулирующий процессы регенерации для местного применения в офтальмологии.

Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные в виде прозрачного бесцветного раствора, допускается легкая опалесценция.

	1 мл
гликозаминогликаны сульфатированные	100 мкг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

5 мл - флаконы стеклянные в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

10 мл - флаконы стеклянные в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

5 мл - флаконы полипропиленовые в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

10 мл - флаконы полипропиленовые в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

1.5 мл - тубик-капельницы - пачки картонные.

Показания

В составе комплексной терапии:

- эрозии, непроникающие раны роговицы, конъюнктивы и склеры;
- проникающие раны роговицы и склеры после хирургической обработки;
- ожоги роговицы, конъюнктивы, склеры (химические и термические);
- повреждения роговицы в результате хирургических вмешательств (кератотомия, кератомилез, кератопластика, экстракция катаракты);
- синдром «сухого глаза»;
- кератит, в т.ч. с изъязвлением роговицы:
- кератоконъюнктивит;
- эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы;
- при контактной коррекции зрения для улучшения переносимости контактных линз;
- как профилактическое средство при инволюционных изменениях в роговице.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 18 лет;
- беременность;

- период кормления грудью (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

Дозировка

При любых повреждениях роговицы, включая операционные, - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 7 дней;

При кератитах, кератоконъюнктивитах, синдроме "сухого глаза" - по 1-2 капли 4-5 раз в день в течение 1 месяца;

При контактной коррекции, первые 3 суток при адаптации к ношению контактных линз - 2 раза в сутки утром и вечером (после снятия линз) по 2 капли в каждый глаз;

При длительном ношении контактных линз - по 1-2 капли утром и вечером в каждый глаз в течение всего периода ношения;

При инволюционных изменениях в роговице - по 1-2 капли утром и вечером в течение месяца.

Побочные действия

Гиперемия конъюнктивы, аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке препарат отсутствуют.

Лекарственное взаимодействие

Фармакологическое взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Беременность и лактация

Противопоказано в период беременности и в период лактации.

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Условия и сроки хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности - 2 года. После вскрытия флакона препарат можно использовать не более чем в течение 15 суток.