

КОМПЛИВИТ ОФТАЛЬМО, таблетки (COMPLIVIT OFTALMO) — инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Комплекс витаминов с микроэлементами и растительными каротиноидами, применяемый при повышенных нагрузках на глаза.

Форма выпуска, состав и упаковка

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от розовато-оранжевого до оранжевого цвета, круглые, двояковыпуклые, с характерным запахом.

	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	1 мг (2907 МЕ)
α-токоферола ацетат (вит. Е)	15 мг
аскорбиновая кислота (вит. С)	50 мг
тиамина гидрохлорид (вит. В ₁)	5 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	2 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	5 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	400 мкг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	3 мкг
рутозид (рутин) (вит. Р)	25 мг
медь (в форме сульфата пентагидрата)	1 мг
цинк (в форме оксида)	5 мг
селен (в форме натрия селенита)	25 мкг
зеаксантин (оптишарпа)	1 мг
лютеин	2.5 мг

Вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный, лимонная кислота, лудипресс (лактозы моногидрат, повидон, кросповидон), повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный), магния стеарат, сахароза (сахар), D-сорбитол (сорбит пищевой), кармеллоза натрия (вивасол).

Состав оболочки: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), макрогол (полиэтиленгликоль), повидон низкомолекулярный (поливинилпирролидон низкомолекулярный), титана диоксид (E171), тальк, краситель солнечный закат желтый (E110).

30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

60 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

90 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

100 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

120 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Показания

- профилактика дефицита витаминов и минералов;
- синдром зрительного утомления (усталость и боль в глазах) при чтении, работе на компьютере, ношении контактных линз; нарушения сумеречного зрения.

Противопоказания

- беременность;
- период лактации;
- детский возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка

Взрослым внутрь после еды, запивая достаточным количеством жидкости. По 1 таб. 1 раз/сут. Продолжительность курса - 3 мес. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

При передозировке пациент должен обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь, промывание желудка; при необходимости - проведение симптоматической терапии.

Лекарственное взаимодействие

Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными комплексами, содержащими витамины А и Е, витамины группы В.

Особые указания

Не рекомендуется превышение рекомендуемой дозы.

При применении препарата возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата и не имеет клинического значения.

Беременность и лактация

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 18 лет.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 2 года.