

ЛЕКРОЛИН, капли (LECROLYN) инструкция по применению

Клинико-фармакологическая группа

Противоаллергический препарат для местного применения в офтальмологии.

Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные в виде прозрачного раствора, бесцветного или слегка желтоватого цвета.

	1 мл
кромогликат натрия	20 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, динатрия эдетат, глицерол, поливиниловый спирт, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы пластиковые — пачки картонные.

Капли глазные в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора.

	1 мл
кромогликат натрия	20 мг

Вспомогательные вещества: динатрия эдетат, глицерол, поливиниловый спирт, вода д/и.

0.25 мл - тубик-капельницы — пакеты бумажные ламинированные трехслойные (2) - пачки картонные.

Показания

- аллергический конъюнктивит;
- аллергический кератит;
- кератоконъюнктивит;
- раздражение слизистой оболочки глаз, обусловленное аллергическими реакциями (факторы окружающей среды, профессиональные вредности, средства бытовой химии, косметические средства, офтальмологические препараты, пыльца растений и перхоть домашних животных).

Противопоказания

- детский возраст до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка

Препарат назначают по 1-2 капли в каждый конъюнктивный мешок 4 раза/сут.

При сезонном аллергическом конъюнктивите лечение следует начинать сразу после появления первых симптомов или применять профилактически до начала сезона появления пыльцы. Лечение продолжают в течение всего сезона цветения или дольше, если симптомы сохраняются.

Правила использования препарата Лекролин в тубик-капельнице

1. Открыть пакет вдоль пунктирной линии.
2. Отделить один тубик-капельницу.
3. Тщательно закрыть пакет.
4. Убедиться, что раствор находится в нижней части тубик-капельницы и вскрыть тубик-капельницу.
5. Закапать 1-2 капли в глаза.

Доза, содержащаяся в тубик-капельнице, достаточна для одного закапывания в оба глаза. После однократного использования тубик-капельницу следует выбросить, даже если осталось содержимое.

Побочные действия

Со стороны органа зрения: > 1/100 - кратковременное ощущение жжения, местное раздражение глаз и быстро проходящее нарушение четкости зрительного восприятия.

Прочие: < 1/10 000 - аллергические реакции.

Передозировка

При местном применении препарата передозировка маловероятна. В экспериментальных исследованиях показано, что местная и системная токсичность хромоглициевой кислоты очень мала.

Симптомы: возможна тошнота.

Лечение: проведение симптоматической терапии.

Лекарственное взаимодействие

Не отмечено отрицательных симптомов взаимодействия хромоглициевой кислоты с другими лекарственными препаратами.

При применении хромоглициевой кислоты возможно уменьшение потребности в применении офтальмологических препаратов, содержащих ГКС.

Особые указания

Глазные капли Лекролин, упакованные во флакон-капельницу, содержат консервант бензалкония хлорид, который может вызвать симптомы раздражения глаз. Поэтому пациентам, носящим контактные линзы, следует удалить их перед применением капель и установить обратно не ранее чем через 15 мин после закапывания.

Глазные капли Лекролин, упакованные в тубик-капельницу, предназначены для одноразового применения, не содержат консерванта, поэтому не замедляют заживление конъюнктивальных или роговичных ран. Эти капли можно применять у пациентов с повышенной чувствительностью к консервантам, а также у пациентов, использующих контактные линзы любого типа.

Не следует касаться глаз кончиком пипетки.

Флакон необходимо закрывать после каждого использования.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после инстилляций препарата появляется кратковременное нарушение четкости зрительного восприятия, не следует управлять автомобилем или работать с техникой, станками или каким-либо другим оборудованием, требующим четкости зрительного восприятия, сразу после применения глазных капель.

Беременность и лактация

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) препарат следует применять с осторожностью и только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода или грудного ребенка.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 4 лет.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Срок годности - 3 года.

После вскрытия флакона-капельницы или вскрытия пакета с тубик-капельницами срок годности 1 мес.