

# СЛЕЗИН, капли (SLEZIN) инструкция по применению

## Клинико-фармакологическая группа

Препарат для увлажнения и защиты роговицы.

## Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные в виде прозрачного, бесцветного раствора.

	1 мл
гипромеллоза	3 мг
декстран 70	1 мг

Вспомогательные вещества: глицерол - 2 мг, борная кислота - 3 мг, натрия тетрабората декагидрат - 350 мкг, калия хлорид - 1.2 мг, натрия хлорид - 6.2 мг, динатрия эдетата дигидрат - 500 мкг, бензалкония хлорид - 75 мкг, натрия гидроксида 1М раствор или хлористоводородной кислоты 1М раствор - до pH 7.4±0.1, вода очищенная - до 1 мл = 1.00645 г.

15 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

## Показания

Синдром сухого глаза.

## Противопоказания

- детский и подростковый возраст до 18 лет (данных о возможности применения нет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Дозировка

Местно.

Закапывают по 1-2 капли в конъюнктивный мешок каждого пораженного глаза по мере необходимости несколько раз в сутки или согласно предписаниям врача. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и назначается врачом. При отсутствии эффекта следует прекратить закапывание препарата.

## Побочные действия

Нечасто (0.1-1%): затуманивание зрения, чувство дискомфорта глаз (жжение, покалывание).

Редко (0.01-0.1%): покраснение глаз, слезотечение, усталость глаз.

Возможно развитие аллергических реакций.

## Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки Слезина не сообщалось.

При попадании в глаза избыточного количества офтальмологического раствора следует промыть глаза теплой водой.

## Лекарственное взаимодействие

Слезин не совместим с глазными каплями, содержащими соли металлов (в т.ч. цинка сульфат).

## Особые указания

При ношении контактных линз перед закапыванием препарата их следует снять и снова установить не ранее, чем через 15 мин после применения препарата.

Препарат Слезин не следует применять для инъекций.

Если после 2-3 дней применения препарата нет улучшения, рекомендуется прервать лечение.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Из-за возможного затуманивания зрения, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

## Беременность и лактация

Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Адекватных и строго контролируемых клинических исследований по безопасности и эффективности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось.

## Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

## Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4 недель.